Jak si mám aplikovat injekci přípravku Clexane (Fraxiparine)?

Umyjte si důkladně ruce a posaďte se, nebo si lehněte do pohodlné polohy
Vyberte si oblast v okolí pasu, nejméně 5 cm pod pupkem a od stávajících modřin či jizev. Pečlivě očistěte kůži v této oblasti.
K podání injekce používejte každý den jiné místo, např. jeden den do levé strany a další den do pravé strany.
Sejměte kryt z jehly.
Aby se udržela sterilita jehly, ujistěte se, že se jehla ničeho nedotýká-
Předplněná injekční stříkačka je nyní připravena k použití.
Před injekcí nevytlačujte pístem vzduchové bubliny, protože by mohlo dojít ke ztrátě léku
Uchopte injekční stříkačku do jedné ruky a palcem a ukazováčkem druhé ruky opatrně stlačte očištěnou oblast kůže, aby se vytvořila kožní řasa.
Vpíchněte jehlu v celé délce kolmo (v úhlu 90°) do kožní řasy.
Stlačte píst a po celou dobu injekce držte kožní řasu v dané pozici.
Vytáhněte jehlu kolmým pohybem nahoru a uvolněte kožní řasu.
Nemasírujte kůži v místě vpichu jehly!
Nepokoušejte se nasadit kryt zpět na jehlu!
Vyhoďte injekční stříkačku (jehlou napřed) do nádoby na ostré předměty, uzavřete důkladně víko a umístěte jej mimo dosah dětí.
Aplikujte vždy pouze jednou denně cca ve stejnou dobu.
V případě vzniku modřin můžete kůži ošetřovat krémy Heparoid či Lioton 100 000.

NeoOrtoClinic s.r.o
MAPO-Medical, s.r.o. BEA Olomouc
tř. Kosmonautů 1338/1a, Olomouc
tel. +420 722 730 060
email: neoortoclinic@gmail.com